
*1 = Lithostratigraphie
*2 = Chronostratigraphie
Saar - Nahe - Senke
Wittlicher Senke
Beckenbereich
Nahe - Mulde
Pfälzer - Mulde
Permokarbon
Rotliegend *1
Nahe - Subgruppe
Glan - Subgruppe
"Randfazies" zum Hunsrück
Kreuznach - Formation
Nierst. - Form.
Wadern - Formation
Sponheim - Form.
Standenbühl - Formation
Donnersberg - Formation
Jakobsweiler - Subf.
Höringen - Subformation
Wingertsweilerhof - Subf.
Schallodenbach - Subf.
Schweisweiler - Subf.
Thallichtenberg - Formation
Oberkirchen - Formation
Disibodenberg - Formation
Meisenheim - Formation
Odernheim-Subformation
Jeckenbach-Subformation
Lauterecken - Formation
Quirnbach - Formation
Wahnwegen - Formation
Altenglan - Formation
Remigiusberg - Formation
Altrich - Formation
Neuerburg-Sbf.
Salmtal-Sbf.
Berlingen-Sbf.
Wittlich-Sbf.
Kinderbeuern - Form.
Sengbüsch-Subf.
Bengel-Subf.
Bausend.-Subf.
Ürzig - Formation
Engelsberg-Subformation
Ignimbrit-Subformation
Springiersbach-Subf.
Stefan *2
Ottweiler-Subgruppe
Breitenbach-Formation
Heusweiler-Formation
Obere Heusw.-Subform.
Untere Heusw.-Subform.
Dilsburg-Formation
Ob. Göttelb.-Formation
Mitt. Göttelb.-Formation
Unt. Göttelb.-Formation
Westfal *2
Saarbrücken-Subgruppe
Unt. Heiligenw.-Formation
Luisenthal-Formation
Geisheck-Formation
Obere Sulzbach-Formation
Mittl. Sulzbach-Formation
Unt. Sulzbach-Formation
Rothell-Formation
St. Ingbert-Formation
Obere Neunkirchen-Formation
Untere Neunkirchen-Formation
In Rheinland-Pfalz nicht aufgeschlossen
Namur *2
Spiesen-Formation
Unter-Karbon
Visé *2
Sedimente von Neustadt, Burrweiler und Hambach
Kristallines Grundgebirge am nordwestlichen Rheingrabenrand: Granit von Edenkoben und Granitgänge von Burrweiler, Granodiorit von Waldhambach, Gneis von Albersweiler