
Ma
360
370
380
390
400
410
Famennium
Frasnium
Givetium
Eifelium
Emsium
Pragium
Lochkovium
praesulcata
expansa
postera
trachytera
marginifera
rhomboidea
crepida
triangularis
linguiformis
rhenana
jamieae
hassi
punctata
transitans
falsiovalis
dispardis
crist. herm.
varcus
hemiansatus
kockelianus
australis
costatus
partitus
patulus
serotinus
inversus
nothoperbonus
excavatus
kitabicus
pireneae
kindlei
sulcatus
pesavis
delta
eurekaensis
postwoschmidti
woschmidti
Sieber-Zone
Elbingerode-Komplex
Elbingeroder Buntschiefer-Formation
Elbingeroder
Riffkalk-Formation
Fe
Elbingeroder Schalstein-Formation
Wissenbach-Formation
Wernigerode-Einheit
Oberer Flinz
Wernigerode-Formation
Kiesel- und Wetzschiefer-Zone
Unterer Flinz
Plattenschiefer-Zone
Wissenbach-Formation
Hauptquarzit-Formation
Blankenburg-Zone
Flinzkalk-Formation
Herzynkalk-Formation
Wissenbach-Formation
Dalmaniten-Schiefer
Kalkgrauwacken-
Tongallen- und
Harzgerode-Zone
Neo-Herzyn
Flinzkalk-Formation
Jüngeres Herzyn
Älteres Herzyn
Formation
Kieselgallenschiefer-Formation
Südharz-Selke Decke
Südharz- und Selke-Grauwacke
Buntschiefer
Haupt-Kieselschiefer
Stiege-Schichten
Südharz-Selke-Quarzit
Wippra-Zone
Fütterungsberg-Metagrauwacken-Formation
Pferdeköpfe-Grünschiefer-Formation
Kieselschiefer / kieselige Schiefer
Tonschiefer (dysaerobe Biofazies)
Tonschiefer (aerobe Biofazies)
Tonschiefer mit Mergel- und Kieselkonkretionen
Tonschiefer mit Kalk-konkretionen (dysaerob)
Quarzarenite und Siltsteine
karbonatische Quarz-arenite und Siltsteine
Litharenite und Siltsteine (Grauwacken)
Vulkanite und Vukanoklastika
Eisenerz-Lager Typ Lahn-Dill
Phosphorite und phosphatische Hartgründe
pelagische Karbonate und Periplattform-Karbonate
heterozoische Karbonate
photozoische Karbonate
hemipelagische und turbiditische Karbonate (anaerobe Biofazies)