
Querfurt-Mulde
(Karsdorf)
Nordöstliches Harzvorland
(Bernburg)
Nördliche Altmark
(Arendsee)
TGL
25.234/11
(1974)
HINZE (1967)
m
Unterer Muschelkalk
Myophorien-
schichten
Myophorientone
Myophorienplatten
Pelitröt
Obere Violettfolge
mit Gips 4
Rote Werksfolge
(mit Doppelquarzit)
Untere Violettfolge
Gips 3
Myophoriendolomit
Salinarröt
Basisgipse (mit
Steinsalzresiduen)
Mittlerer
Buntsdst.
Solling - Formation
50
100
150
200
vi-gr
ro-bn
Karbonat E
Kavernenkalk
Grau(violett)mergel
mit den Sulfaten 4 und 5
und Karbonat D
Rotmergel
mit Karbonat C
Graumergel
mit Karbonat B
Sulfat 3
Myophoriendolomit
(= Karbonat A)
Sulfat 2
dolomitische Zwischenmittel
Sulfat 1b
Rötsteinsalz
Sulfat 1a
Solling - Formation
Myophorien-
schichten
Pelitröt
Salinarröt
Mittlerer Buntsandstein
Röt 4
so 4
Röt 3
so 3
Röt 2
so 2
Röt 1
so 1
Ton-, Siltstein;
tonig; siltig
Fein- bis Mittelsandstein,
fein bis mittelsandig
Mergelstein
(kalkig)
Steinsalz
vi-gr violettgrau
Mittel- bis Grobsandstein,
mittel- bis grobsandig
Silt- /Tonstein,
sandig
Mergelstein
(dolomitisch)
Auslaugungsresiduen
ro-bn rotbraun
Dolomit
Kalkstein
Sulfat (Gips, Anhydrit)
Zweischaler