




Randprofil (Culmitzsch, Zeitz–Schmölln)

System	Gruppe	Folge					
PERM	Zechstein	Fulda-Folge (z7)	Untere Sandstein-Tonstein-Wechselagerung in der oberen Fulda-Folge (z7bT)		„Übergangsfolge“ i.S. von Hecht (1980)	3. Zyklus	
			Bröckelschiefer mit plattigen feinkörnigen Sandsteinen in der Unteren Fulda-Folge (z7aBS)			2. Zyklus	
		Friesland-Folge (z6)	Unterer Bröckelschiefer und Basissandstein in der Friesland-Folge (z6SW)			1. Zyklus	
		Ohre-Folge (z5)	(fehlend?)				
		Aller-Folge (z4)	Oberer Aller-Ton (z4Tb)		Aller-Ton (z4T)	„Obere Letten“	
			Aller-Anhydrit (teilweise vorhanden, z4AN)				
			Unterer Aller-Ton (z4Ta)				
		Leine-Folge (z3)	Oberer Leine-Ton (z3Tb)				
			Leine-Anhydrit (teilweise vorhanden, "Hauptanhydrit", z3AN)				
			Leine-Karbonat ("Plattendolomit", z3CA)				
			Dritte Graue Folge (z3DG)				
		Staßfurt-Folge (z2)	Zweite Rote Folge (z2ZR, bei Culmitsch bis in z3 reichend)				
		Werra-Folge (z1)	Zweite Graue Folge (bei Culmitsch, z1ZG)		Ob. W.-Anhydrit (bei Zeitz-Schmölln, z1ANc)		
			Culmitscher Sandstein (z1CS)		Sandstein, Konglomerat, Siltstein der klastischen Randfazies (z1CS)		
			Erste Rote Folge (z1ER)				
			Werra-Dolomit (z1D)				
			Erste Graue Folge (z1EG)				
Werra-Basalkonglomerat (z1C)							