



Beckenprofil Thüringen

System	Gruppe	Folge			
PERM	Zechstein	Fulda-Folge (z7)	Wechsellagerung in der oberen Fulda-Folge (z7bW)	„Bröckel-schiefer“ i. S. von Seidel (1961, 1965)	3. Zyklus
			Sandstein und Sandstein-Tonstein-Wechsellagerung in der unteren Fulda-Folge (z7aSW)		2. Zyklus
		Friesland-Folge (z6)	Sandstein und Sandstein-Tonstein Wechsellagerung in der Friesland-Folge (z6SW)		1. Zyklus
		Ohre-Folge (z5)	Graugrüne Grenzbank (z5Tg)	„Oberste Zechstein-leiten“	
			Ohre-Ton (z5T)		
		Aller-Folge (z4)	Oberer Aller-Ton (z4Tb)		
			Oberer Aller-Anhydrit („Grenzanhidrit“, z4ANb)		
			Aller-Steinsalz (z4NA)		
			Unterer Aller-Anhydrit (z4ANa)		
		Leine-Folge (z3)	Unterer Aller-Ton (z4Ta)		„Roter Salzton“
			Oberer Leine-Ton (z3Tb)		
			Leine-Steinsalz (z3NA)		
			Leine-Anhydrit („Hauptanhidrit“, z3AN)		
		Steißfurt-Folge (z2)	Leine-Karbonat („Plattendolomit“, z3CA)		
			Unterer Leine-Ton (z3Ta)		„Grauer Salzton“
			Oberer Steißfurt-Ton (z2Tb)		
			Oberer Steißfurt-Anhydrit (z2ANb, nur bei Fehlen von z2KSt)		
			Kalisalzflöz Steißfurt z2KSt	Leitbänke 1–19	
			Steißfurt-Steinsalz (z2NA)	Südharzsteinsalz (z2NAc)	Leitbänke I–X
				Steinsalzanhydrit (z2NAb2)	
				Anhydritregion (z2NAb1)	
		Werra-Folge (z1)	Unterer Steißfurt-Anhydrit (z2ANa, „Basalanhydrit“)		
			Steißfurt-Karbonat (z2CA, „Hauptdolomit“)		
			Unterer Steißfurt-Ton (z2Ta, nur lokal)		
			Oberer Werra-Anhydrit (z1ANc)		
			Oberer Werra-Ton (z1Tb)		
			Werra-Steinsalz (z1NA)		
Unterer Werra-Anhydrit (z1ANa)					
Mittlerer Werra-Ton (z1ANT, nur lokal)					
Werra-Karbonat („Zechsteinkalk“, z1CA)					
Unterer Werra-Ton („Kupferschiefer“, z1Ta)	Mutterflöz (nur lokal, z1TaCA)	Werra-Basalkonglomerat (nur lokal, z1C)			